

全新型 乳房腫瘤微創手術

為什麼要做乳房切片組織診斷？

發現乳房有異狀或腫塊時，不要慌張害怕 必須經過醫師進一步檢查，才能判斷是否為乳癌



乳房組織切片診斷是判定腫瘤可為良性或惡性的唯一可靠方法。

盡早發現疾病的種類與階段是有效治療乳癌的一大關鍵！

乳房切片診斷及良性腫瘤切除新方法



疤痕極小，疼痛度低，準確率高

從1996年以來全世界已有超過100萬女性利用真空輔助切片系統，來診斷出乳房良性與惡性，讓醫師不需動手術，即可透過超音波影像或X光乳房立體定位系統，將探針移到病灶部位，取得足量的組織樣本，完成準確的切片，或在超音波下可見的腫瘤切除。真空輔助切片系統只需一次穿刺，切口小且無須縫合，所以留下的疤痕極微小且手術時間短。

	Encor 安可兒 真空輔助乳房切片	外科 開放式手術	一般粗針切片
術後傷口 (3個月)			
組織取得方式	真空抽吸輔助以7G、10G之切片針抽取組織，只需扎一針可取得十幾個組織樣本	使用手術刀切割組織，取得樣本	使用12G-16G 粗針，每次取得一個樣本，需多次扎針取樣
切口大小	0.3-0.5公分	2-3公分	0.3-0.5公分
傷口縫合	不需縫合，只需在傷口上貼美容膠	需縫線縫合	不需縫合，只需在傷口上貼美容膠
麻醉方式	局部或全身麻醉	局部或全身麻醉	局部麻醉
取樣地點	門診或開刀房	門診或開刀房	門診或開刀房
手術時間	20-30分鐘	2-3 小時	30分鐘
術後乳房外觀 (副作用)	不留醜疤痕 不會造成乳房凹陷	極易留下疤痕 可能造成乳房凹陷	不留疤痕 不會造成乳房凹陷

*詳細資訊請洽本院乳腺中心
分機 089-322833 #131或132